


Quand arrêter l'éradication de l'*Helicobacter Pylori* ?



20ème journée de gastro-entérologie de Cochin

Dr Juliette Leroux - juliette.leroux@aphp.fr



Contexte

Maladie infectieuse

Antibio-résistance

Traiter tout le monde?

Faire le bon choix



Impact sur le microbiote



Complications liées à HP

- Anémie ferriprive, carence en B12
- Dyspepsie
- Ulcère gastroduodéal
- Adénocarcinome gastrique
- MALT


Traitement




90% succès

Traitement

B



A



Quand arrêter ?

Véritable échec ???

-> 75% des patients ont eu un traitement inadapté ou sous optimal

Après 3 lignes de traitement = Clarithro et Levo - R

-> RCP du GEFH

RCP GEFH

Cliniciens : HGE, infectiologues, pédiatres ; + bactériologistes et pharmaciens
Dossiers à soumettre par le site www.helicobacter.fr, section professionnels de
santé/RCP

Fiche à remplir et à envoyer à contact-GEFH@helicobacter.fr

Compte rendu dans la semaine

S'assurer de la bonne prise des IPP

OMEPRAZOLE 20mg 2/jour pour PYLERA®

RABEPRAZOLE 20mg ou ESOMEPRAZOLE 40mg 2/jour pour les autres

- L'avenir :
 - Les P-CAB (potassium competitive acid blockers) comme le VONOPRAZAN
 - Permettent de maintenir un pH haut durable et continu, indépendant du CYP2C19
 - Etudes montrent sa supériorité aux IPP et surtout chez les patients résistants aux ATB

Quand arrêter ?

Jamais d'urgence !

- Nouvelle tentative à réserver qu'aux situations formelles :
 - UGD
 - ATCD familial au 1^{er} degré de cancer
 - ATCD personnel de lésion pré-néoplasique ou de cancer avec gastrectomie partielle
- Sinon : faible bénéfice, rassurer le patient, ré-évaluer à 3-5ans.

Rifabutine

- Traitement des mycobactéries atypiques dans VIH et tuberculose
- Résistance <2%
- **Rares mais sérieuses toxicités médullaire et oculaire**
- Pas en probabiliste, **préférable après accord du groupe GEFH**
- Indications formelles à réserver après au moins 2 échecs de traitement et antibiogramme
- Sous forme de trithérapie 10 jours avec IPP et amoxicilline, 300mg/j

Take home messages

- Après 3 lignes de traitement
- Après tests de sensibilité
- Après vérification de la bonne prise du traitement
- Après avis RCP